

Becutan KIDS VITS protiv kolika

Kapi za oralnu upotrebu

Proizvod sadrži: simetikon u maslinovom ulju, vitamin A, vitamin E i koenzim Q₁₀.

Terapeutske indikacije

Becutan KIDS VITS protiv kolika je medicinsko sredstvo namijenjeno za tretman u slučaju:

- nadimanja i gasnih kolika kod beba, djece i odraslih,
- gastrointestinalnog nadimanja,
- dispeptičkih poremećaja.

Doziranje i način primjene

Pojedinačna doza: 20 kapi **Becutan KIDS VITS protiv kolika** sadrži 40 mg simetikona.

Odrasli: 20-40 kapi, razblažiti u tečnosti, 2-4 puta na dan, najbolje poslije obroka ili prema uputstvu liječnika.

Djeca: 20 kapi, razblažiti u tečnosti, najbolje poslije obroka, 1-3 puta dnevno ili prema uputstvu liječnika.

Bebe: 20 kapi, razblažiti u tečnosti, najbolje poslije obroka, 1-2 puta dnevno ili prema uputstvu liječnika.

Kako koristiti

Dobro protresti prije upotrebe proizvoda. Bocu pravilno zatvorite nakon upotrebe.

Skladištenje

Čuvati na sobnoj temperaturi. Čuvajte proizvod pravilno zatvoren i daleko od izvora toplote.

Proizvod se ne smije koristiti više od 30 dana nakon otvaranja.

Upozorenja

Sredstvo ne podliježe posebnim mjerama predostrožnosti za upotrebu.

Ipak:

- proizvod se može pojaviti u dvije odvojene faze. Poslije miješanja isti bi trebalo da se pojavi kao homogena emulzija;
- čuvati van domašaja djece;
- ne prekoračiti preporučene doze;
- ne koristiti proizvod nakon isteka roka upotrebe; rok trajanja odnosi se na netaknuti proizvod koji je pravilno skladišten;
- ne koristiti proizvod ako pakovanje nije netaknuto;
- sve komponente koje čine proizvod, uključujući i kapaljku, moraju biti netaknute;
- nakon kratkog perioda liječenja (7 dana) ako nema značajnih rezultata, obratiti se liječniku;
- ne koristite proizvod duže od 30 dana;
- u slučaju neželjenih reakcija prekinuti upotrebu proizvoda i obratiti se svom liječniku kako bi se utvrdila odgovarajuća terapija;
- tokom upotrebe, ako sumnjate na slučajno zagađenje kapaljke, pažljivo je operite prije nego što je vratite u bocu kako biste spriječili dalje zagađenje;
- pridržavanje uputstava iz uputstva o medicinskom sredstvu smanjuje rizik od neželjenih efekata;
- važno je da se obratite liječniku ili farmaceutu ako se pojave neželjeni efekti koji nisu opisani u ovom uputstvu o medicinskom sredstvu;
- ne koristiti u slučaju sumnje na perforaciju crijeva ili ileusa.

Kontraindikacije

Ne koristiti u slučaju reakcija preosjetljivosti na sastojke proizvoda.

Interakcije i nekompatibilnosti

Nisu poznate interakcije proizvoda sa drugim lijekovima. Nisu prijavljene nekompatibilnosti sa drugim farmaceutskim proizvodima. Međutim, u bibliografiji je dokumentovan prikaz slučaja interakcije između simetikona i levotiroksina. Iz tog razloga, u slučaju trenutne terapije lijekovima na bazi levotiroksina, savjetujte se sa svojim liječnikom prije upotrebe **Becutan KIDS VITS protiv kolika**.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća: ne postoje adekvatni podaci o upotrebi proizvoda kod trudnica, stoga ih ne treba upotrebljavati ako nije neophodno i ako nije po uputi liječnika nakon njegove procjene.

Laktacija: Nije poznato da li se simetikon izlučuje u majčino mlijeko, pa ga ne treba upotrebljavati ako nije neophodno i ako nije po uputi liječnika nakon njegove procjene.

Uticaj na vožnju: Nije prijavljeno dejstvo na sposobnost vožnje i sposobnost upotrebe automobila.

Neželjeni efekti i predoziranje

Kao i svi proizvodi bazirani na simetikonu i ovaj medicinski proizvod može izazvati neželjene efekte, čak i ako ih ne ispoljavaju svi ljudi. Obavijestite svog liječnika ako tokom tretmana **Becutan KIDS VITS-om protiv kolika** primjetite sljedeće neželjene efekte:

- povraćanje, proliv, bol u trbuhu, bol u ileumu, mučninu;
- osip;
- oticanje lica, očiju i usana, oticanje grla sa otežanim disanjem (angioedem).

Ove neželjene pojave se javljaju rijetko. Nisu prijavljeni efekti predoziranja.

Opis proizvoda

Becutan KIDS VITS protiv kolika je medicinsko sredstvo klase IIa koje se prodaje u bocama od 30 ml sa kapaljkom i sadrži uljani rastvor simetikona.

Odlaganje

Sredstvom kojim je istekao rok trajanja mora se upravljati u skladu sa propisima za tretiranje otpada propisanim u lokalnoj regulativi. Ni u kojem slučaju ne odlažite proizvod ili ambalažu u okoliš.

Datum posljednje revizije teksta: avgust 2017.

Datum posljednje revizije uputstva o medicinskom sredstvu: februar 2020.

Distributeri:

Tuzla Farm d.o.o., Ulica Rudarska 71, 75000 Tuzla, BIH

MGM Farm d.o.o., Ulica 311 Lahke Brigade, 72240 Kakanj, BIH

Interpromet d.o.o., Ulica Kulska obala b.b., 79220 Novi Grad, BIH

Zefarm d.o.o., Ulica Goraždanska, 72000, Zenica, BIH

Phoenix Pharma d.o.o., Ulica Donja Ljeljenča br. 015B 76300 Bijeljina, BiH

Farmavita d.o.o., Ulica Igmanska 5a, Vogosca, 71000 Sarajevo, BIH



SIIT srl
Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI), ITALY

